



## Informationsblatt zur Bestimmung der Transportfähigkeit von ausgewachsenen Rindern

Sollten Sie bei der Einschätzung des Zustandes eines Tieres Bedenken haben oder Hilfe benötigen, dann sollten Sie das Tier nicht aufladen und Rücksprache mit einem Tierarzt halten.

Beschreibung des Tierzustandes	Parameter	Transportfähig
Guter Gesamteindruck (Rind mit gutem Allgemeinbefinden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufmerksames, waches Tier mit trockenem, glatten, glänzenden Fell, ruhiger Atmung, normalem Ernährungszustand, das alle vier Gliedmaßen im Stand und in der Bewegung gleichmäßig belastet</li> </ul>	Ja
Schlechter Gesamteindruck (Rind mit gestörtem Allgemeinbefinden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilnahmsloses Tier</li> <li>verwaschener, stumpfer Blick</li> <li>nachhaltige Fressunlust/Futter- bzw. Wasserverweigerung und/oder</li> <li>Erhöhte (höher als 39,5°C) oder erniedrigte (niedriger als 37,5°C) Körpertemperatur</li> <li>Deutlich erhöhte Atemfrequenz, deutlich erschwerte/flache Atmung oder mit offenem Maul, deutliches Husten und/oder</li> <li>Anzeichen von starken Schmerzen, abnorme Haltung (z.B. aufgekrümmter Rücken) oder veränderter Gang</li> <li>starkes Schwitzen</li> <li>extreme Abmagerung</li> </ul>	Nein**

**\*\*Empfehlung für Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn ein Tier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb als nicht transportfähig erachtet wird:**

- Isolierung des betroffenen Tieres von den anderen Tieren
- Umgehende Behandlung des Tieres und/oder tierärztliche Beratung
- Wenn notwendig, Notschlachtung oder Nottötung, so dass dem Tier kein unnötiges Leiden entsteht.

Beschreibung des Tierzustandes	Parameter	Transportfähig
Gehunfähige Tiere	<p>Das Tier ist unfähig,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzustehen (festliegend) oder sich aufrecht zu halten (alle vier Beine können nicht belastet werden)</li> <li>Sich ohne Schmerzen fortzubewegen (Stark lahm, minimale Belastung der Gliedmaßen)</li> <li>Auf dem Transport das Gleichgewicht zu halten</li> </ul>	Nein**
Wunden, Wundnähte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Große (blutende) Wunden, Haut und Muskeln sind durchtrennt z.B. Wunde an der Klaue, vollständiger Hornabriss</li> <li>OP-Wunde (Kaiserschnitt, Labmagen-OP): wenige Tage alt und/oder wieder eröffnet</li> <li>Scheidenverschluss und Transport in der ersten Woche nach der Kalbung, oder Transport mindestens eine Woche nach dem Kalben und das Tier ist bei schlechtem Allgemeinbefinden</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scheidenverschluss und Transport mindestens eine Woche nach dem Kalben und das Tier ist bei gutem Allgemeinbefinden</li> <li>Genähte, verheilte Wunde, die nicht Gefahr läuft, dass sich das Tier hier erneut verletzt</li> <li>Kleine begrenzte, oberflächliche Wunden, lediglich die Haut ist betroffen und blutet wenig (z.B. Teilabriss Horn)</li> </ul>	Ja
Organvorfälle (z.B. Enddarm, Scheide, Gebärmutter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorgefallene Organe, wie beispielsweise der Enddarm, Scheide, Gebärmutter können leicht verletzt werden und können zu Schmerzen und starken Blutungen führen</li> </ul>	Nein**
Starke, anhaltende Blutungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiere mit beträchtlichem Blutverlust, der sich während des Transportes verstärken und zum Tod des Tieres führt kann (z.B. Blutfluss aus der Scheide)</li> </ul>	Nein**
Aufgegaste Tiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgeblähter Leib, Atemschwierigkeiten, ggf. Kreislaufzusammenbruch</li> </ul>	Nein**
Hochträchtige oder frisch abgekalbte Tiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiere im letzten Trächtigkeitsmonat oder Tiere, die innerhalb der letzten Woche abgekalbt haben (im Zweifelsfall soll der Tierhalter Auskunft geben)</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundsätzlich sind keine hochtragenden Tiere (letztes Drittel) für die Schlachtung abzugeben</li> </ul>	Nein**
Heraushängende Nachgeburt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine aus der Scheide heraushängende Nachgeburt ist ein Hinweis darauf, dass das Tier kürzlich abgekalbt oder abortiert hat</li> </ul>	Nein**
Extreme Abmagerung/ Auszehrung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgezehrte Tiere sind zu schwach für den Transport, da ihre Muskeln nicht kräftig genug sind, um ihren Körper zu halten</li> <li>Rippen und Wirbel sind deutlich sichtbar</li> </ul>	Nein**
Schwierigkeiten bei der Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwierigkeiten beim Gehen (ungleichmäßiger Gang, verkürzte Schritte, betroffene Gliedmaße ist nicht sofort zu identifizieren), jedoch Nutzung aller Beine ohne Schmerzen</li> <li>Lahmheit: ungleichmäßige Belastung der Gliedmaßen, so dass das betroffene Bein sofort identifizierbar ist und/oder offensichtlich verkürzte Schritte, meist mit aufgewölbtem Rücken, <b>alle</b> vier Beine werden belastet.</li> </ul>	Ja

Beschreibung des Tierzustandes	Parameter	Transportfähig
Schwierigkeiten bei der Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahmheit: ungleichmäßige Belastung der Gliedmaßen so, dass das betroffene Bein sofort identifizierbar ist und/oder offensichtlich verkürzte Schritte, meist mit aufgewölbtem Rücken, <b>nicht alle</b> vier Beine werden belastet und/oder kann nicht so schnell gehen wie ein zügiger Mensch</li> </ul>	Nein**
Abnormaler Ausfluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massiver eitriger Ausfluss aus der Gebärmutter und Anzeichen einer schweren Allgemeinerkrankung des Tieres</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokaler Prozess, Nasenausfluss ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden des Tieres</li> </ul>	Ja
Schwellungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestörtes Allgemeinbefinden, heiße, gerötete, schmerzempfindliche Schwellung, führt zu abnormaler Haltung oder verändertem Gang, ggf. mehrere Stellen betroffen und erhöht das Verletzungsrisiko auf dem Transport</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelne und abgegrenzte Schwellung ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden, kein Verletzungsrisiko, keine Lahmheit</li> </ul>	Ja
Durchfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verlust von bedeutenden Mengen an Flüssigkeit und schlechtes Allgemeinbefinden</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Begrenzter Flüssigkeitsverlust und das Tier hat ein gutes Allgemeinbefinden</li> </ul>	Ja
Erschwerte Atmung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestörtes Allgemeinbefinden, Atemnot (offenes Maul, vorgestreckter Kopf und Hals, breitgestellte Vorderbeine, Nach-Luft-Schnappen und Speicheln)</li> </ul>	Nein**
Euterprobleme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangränöse Mastitis: bläulich rot verfärbtes Euter mit feucht glänzender Wunde und hohem Todesrisiko, abnorme Haltung, veränderter Gang</li> </ul>	Nein**
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokaler Prozess, Papillome zwischen den Euterviervierteln ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden</li> </ul>	Ja
Laktierende Kühe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Tier ist alle 12 Stunden zu melken</li> <li>Laktierende Kühe die nicht regelmäßig gemolken werden, können auf dem Transport erhebliche Schmerzen erleiden</li> <li>Milch läuft aus dem Euter, schmerzhaftes Euter</li> </ul>	Nein**
Einäugige/Blinde Tiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehbehinderte Tiere sollten in ihrer sozialen Gruppe transportiert werden</li> </ul>	Ja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blinde Tiere dürfen nicht transportiert werden (nur unter ganz bestimmten Bedingungen, die von einem Tierarzt festzulegen sind, kann ein blindes Tier über kurze Strecken transportiert werden, wenn es keine Anzeichen von zusätzlichem Stress zeigt)</li> </ul>	Nein**

Dieses Informationsblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es dient lediglich als Zusammenfassung. Alle ausführlichen Informationen erhalten Sie von einem Tierarzt oder im EU-Leitfaden „Praxisleitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit von adulten Rindern“.